

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА,

принимающего препарат Тофара®[®], таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг и 10 мг

Эта Памятка предназначена для пациентов, которым назначен препарат Тофара®[®]

Эта Памятка содержит в себе важную информацию о безопасности препарата Тофара®[®]. Если Вы не понимаете эту информацию, попросите Вашего врача объяснить Вам.

Держите эту Памятку при себе и показывайте ее любому врачу, принимающему участие в Вашем лечении. Если Вы прекратите принимать препарат Тофара®[®], держите эту Памятку при себе в течение как минимум 2 месяцев после приема последней дозы препарата Тофара®[®].

Пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению препарата перед приемом препарата Тофара®[®].

Сообщите Вашему лечащему врачу обо ВСЕХ препаратах, которые Вы принимаете, включая препараты, отпускаемые по рецепту и без рецепта, витамины и биодобавки.

Некоторые лекарственные препараты при совместном применении с препаратом Тофара® могут изменять уровень тофацитиниба в крови, в результате чего Вам может потребоваться коррекция дозы препарата Тофара®.

Сообщите лечащему врачу, прежде чем принимать препарат Тофара®, если Вы принимаете какие-либо из следующих лекарств:

- рифампицин – применяется для лечения бактериальных инфекций;
- флуконазол, кетоконазол – применяется для лечения грибковых инфекций;
- такролимус, циклоспорин – применяются для подавления иммунной системы.

Не принимайте препарат Тофара®, если Вы принимаете в настоящее время биологические препараты, такие как ингибиторы фактора некроза опухоли, антагонисты интерлейкинов (ИЛ-1R, ИЛ-6R), моноклональные анти-CD20 антитела, антагонисты ИЛ-17, антагонисты ИЛ-12/ИЛ-23, антиинтегрины, селективные ко-стимулирующие модуляторы, а также мощные иммунодепрессанты, такие как азатиоприн, циклоспорин и такролимус. Прием препарата Тофара® с этими препаратами может увеличить риск иммуносупрессии и инфекции. Если Вы сомневаетесь, относится ли препарат, который Вы принимали или принимаете на данный момент к перечисленным группам, проконсультируйтесь с врачом.

Прием препарата Тофара® может увеличить риск развития инфекций, некоторых видов злокачественных новообразований (рак легкого, рак молочной железы, меланома, рак предстательной железы, рак поджелудочной железы и немеланомный рак кожи). Обязательно сообщите врачу, если у Вас были диагностированы хроническая или тяжелая инфекция, включая вирусный гепатит или туберкулез, а также в случае, если были диагностированы новообразования.

Пациенты в возрасте 65 лет и старше могут подвергаться повышенному риску инфекций, инфаркта миокарда и некоторых видов рака. Если Ваш возраст 65 лет или больше, Ваш врач может решить, что препарат Тофара® Вам не подходит.

В случае, если Ваш возраст 65 лет или больше, врач расскажет Вам о мерах предосторожности и симптомах, когда необходимо срочно обратиться за медицинской консультацией, также возможно, Вам потребуется более частый контроль со стороны врача.

Во время лечения препаратом Тофара®

Немедленно обратитесь к врачу, если Вы испытываете какие-либо из следующих признаков и симптомов:

- внезапная одышка или затрудненное дыхание, боль в груди или боль в верхней части спины, отек ноги или руки, боль в ноге или болезненность при надавливании, покраснение или изменение цвета ноги или руки могут быть признаками венозной тромбоэмболии;

- затрудненное дыхание или глотание, головокружение, отек лица, губ, языка и/или горла, сильный зуд кожи, появление сыпи или волдырей могут быть признаками аллергической реакции (гиперчувствительности).

- повышение температуры тела, озноб, потливость, усталость, длительный кашель, одышка, появление мокроты или изменение количества или цвета мокроты, боль в мышцах, теплая на ощупь кожа или покраснение или болезненность кожи, или появление волдырей на теле, потеря веса, трудности или боль при глотании, диарея или боль в желудке, болезненное или учащенное мочеиспускание могут быть признаками серьезных инфекций (включая сепсис, оппортунистические инфекции, туберкулез).

- симптомы опоясывающего герпеса, таких как болезненная кожная сыпь или волдыри;

- если Вы вступали в контакт с больными туберкулезом;

- сильная боль в груди или ощущение стеснения в груди (которые могут распространяться на руки, челюсть, шею и спину), одышка, холодный пот, головокружение или внезапная слабость могут быть признаками инфаркта миокарда;

- любое увеличение лимфатических узлов на шее, подмышках или в паху; постоянное чувство усталости; лихорадка; ночная потливость; постоянный или усиливающийся кашель; затрудненное дыхание; охриплость или свистящее дыхание; необъяснимая потеря веса;

- любой новый рост на коже или любые изменения в существующих родинках или пятнах;

- симптомы заболевания легких, такие как одышка;

- повышение температуры тела, боль в желудке или животе, кровь в стуле, изменение частоты и характера стула неизвестной этиологии могут быть признаками перфорации желудочно-кишечного тракта;

- пожелтение кожи, тошнота и рвота;

- если Вы собираетесь вакцинироваться. При применении препарата Тофара® не рекомендуется вакцинация некоторыми типами вакцин;

- если Вы думаете, что забеременели, или планируете беременность. Прием препарата Тофара® противопоказан в период беременности. Женщинам детородного возраста следует использовать эффективные методы контрацепции во время лечения препаратом Тофара® и в течение как минимум 4 недель после приема последней дозы препарата.

- Не кормите ребенка грудью во время лечения препаратом Тофара®.

Другая информация (пожалуйста, заполните)





ФИО пациента	
ФИО лечащего врача	
Номер телефона лечащего врача	

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению препарата Тофара® на сайте grls.rosminzdrav.ru (Государственный реестр лекарственных средств) для получения дополнительной информации.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, проконсультируйтесь с врачом или другим медицинским работником.

Если Вы наблюдаете у себя развитие нежелательных реакций, сообщите об этом лечащему врачу, фармацевту или другому медицинскому работнику.

О развитии нежелательных реакций Вы так же можете сообщить в компанию ООО «ПСК Фарма» по:

  - электронной почте pv@rusbiopharm.ru
  - телефону горячей линии по эффективности и безопасности (24 часа) [8 \(800\) 234-16-99](tel:88002341699).

Сообщайте о развитии любой нежелательной реакции, даже если она не указана в инструкции по медицинскому применению препарата Тофара®.